

多発性骨髄腫 (初発)  
VMP療法(1~4コース) (急速静注)

コース目

患者ID: @PATIENTID

患者氏名: @PATIENTNAME

身長(cm)	体重(kg)	体表面積(m <sup>2</sup> )
#HEIGHT01_Do	#HEIGHT01_D	#VALUE!

投与スケジュール: 1コース: 42日間

目標コース回数: 1~4コース

使用薬剤: ボルテゾミブ: ボルテゾミブ 3mg/V  
メルファラン (L-PAM):メルファラン錠2mg  
プレドニゾン (PSL) :プレドニン錠5mg

注意: 末梢神経障害、間質性肺炎の定期的チェック。  
発症時は用法用量に従い減量~中止。  
メルファランおよびプレドニンは年齢・全身状態等により適宜減量する。

投与量:

薬剤	投与量	計算値	投与量(mg)	投与日
ボルテゾミブ	1.3 mg/m <sup>2</sup>	#VALUE!		1, 4, 8, 11, 22, 25, 29, 32
メルファラン	9 mg/m <sup>2</sup>	#VALUE!		1~4
プレドニン錠	60 mg/m <sup>2</sup>	#VALUE!		1~4

<< タイムスケジュール: 開始時刻 >>

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

Day1, 4, 8, 11	1月1日 (土)	1月4日 (火)	1月8日 (土)	1月11日 (火)
22, 25, 29, 32	1月22日 (土)	1月25日 (火)	1月29日 (土)	2月1日 (火)
0:00	① 生理食塩液 50mL + デキサート 6.6mg 15分で点滴静注			
0:15	② 生理食塩液 50mL + ボルテゾミブ 0.0mg ※調製時は、生理食塩液20mLを抜き。全量を30mLとする。 全開(3~4分)で点滴静注			
0:30	③ 生理食塩液 50mL フラッシュ			

Day1~4	1月1日 (土) ~	1月4日 (火)
内服	メルファラン錠 2mg	0錠
	プレドニン錠 5mg	0錠

REFERENCE

Jesus F. San Miguel, M.D., Ph.D., Rudolf Schlag, M.D., Nuriet K. Khuageva, M.D., Ph.D., et al; N Engl J Med 2008;359:906-17  
Bortezomib plus melphalan and prednisone for initial treatment of multiple myeloma  
2011年10月度化学療法プロトコール審査委員会承認: 2011年10月17日