

# 多発性骨髄腫 (初発) VMP療法 (5~コース) (急速静注)

コース目

患者ID : @PATIENTID

患者氏名 : @PATIENTNAME

身長(cm)	体重(kg)	体表面積(m <sup>2</sup> )
#HEIGHT01_Do	#WEIGHT01_Dc	#VALUE!

投与スケジュール : 1コース : 42日間

目標コース回数 : 5~コース

使用薬剤 : ボルテゾミブ : ボルテゾミブ 3mg/V

メルファラン (L-PAM) :メルファラン錠2mg

プレドニゾン (PSL) : プレドニン錠5mg

注意 : 末梢神経障害、間質性肺炎の定期的チェック。

発症時は用法用量に従い減量~中止。

メルファランおよびプレドニンは年齢・全身状態等により適宜減量する。

8コースを超えて継続する場合は、適宜減量・投与間隔の延長など投与量の調節を要する。

投与量 :

薬剤	投与量	計算値	投与量(mg)	投与日
ボルテゾミブ	1.3 mg/m <sup>2</sup>	#VALUE!		1, 8, 22, 29
メルファラン	9 mg/m <sup>2</sup>	#VALUE!		1~4
プレドニン錠	60 mg/m <sup>2</sup>	#VALUE!		1~4

<< タイムスケジュール : 開始時刻 >>

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

Day1, 8, 22, 29	1月1日 (土)	1月8日 (土)	1月22日 (土)	1月29日 (土)
0:00	① 生理食塩液 50mL + デキサート 6.6mg 15分で点滴静注			
0:15	② 生理食塩液 50mL + <b>ボルテゾミブ 0.0mg</b> ※調製時は、生理食塩液20mLを抜き。全量を30mLとする。 全開 (3~4分) で点滴静注			
0:30	③ 生理食塩液 50mL フラッシュ			

Day1~4	1月1日 (土) ~	1月4日 (火)
<b>内服</b>	メルファラン錠 2mg	<b>0錠</b>
	プレドニン錠 5mg	<b>0錠</b>

## REFERENCE

Jesus F. San Miguel, M. D., Ph. D., Rudolf Schlag, M. D., Nuriet K. Khuageva, M. D., Ph. D., et al; N Engl J Med 2008;359:906-17  
Bortezomib plus melphalan and prednisone for initial treatment of multiple myeloma  
2011年10月度化学療法プロトコール審査委員会承認 : 2011年10月17日