

悪性軟部腫瘍 進行・再発 2nd Line以降 Eribulin単独療法

患者ID : @PATIENTID

コース目

患者氏名 : @PATIENTNAME

身長(cm)	体重(kg)	体表面積(m ²)
HEIGHT01_Dc	WEIGHT01_Dc	#VALUE!

アルコールアレルギー
※必ず無いことを確認

投与スケジュール: 1コース21日

使用基準: class A (day8 class C)

使用薬剤: エリ布林: エリ布林注 1mg/2mL/V

※投与開始前に肝機能の状態を把握し、肝機能検査 (AST, ALTなど) を行うこと

※QT延長があらわれたとの報告があるので、投与開始前に心電図検査及び電解質検査を行い

心機能の状態を把握すること

※本剤の化学療法未治療例における有効性及び安全性は確立していない。□

※適正使用ガイドに準じること。

※アルコールアレルギーの有無について確認すること。

薬剤	投与量	計算値	投与量(mg)	投与日
エリ布林	1.4 mg/m ²	#VALUE!		1, 8

<< タイムスケジュール >>

開始日 (Day1): 1月1日 (金)

10時00分	①	生理食塩液 50mL 15分で点滴静注	+	グラネトロン 1 A	+	デキサート3.3mg
10時15分	②	生理食塩液 50mL 全開5分で点滴静注	+	エリ布林注	0.0mg	0.0mL
10時20分	③	生理食塩液 50mL フラッシュ				

day8 1月8日 (金) 同様に行う

day15 1月15日 (金) --- 休薬 ---

REFERENCE

Patrick Schoffski, Sant Chawla, Robert G Maki, et al. Lancet 2016;387:1629-37
Eribulin versus dacarbazine in previously treated patients with advanced liposarcoma or leiomyosarcoma:
a randomised, open-label, multicentre, phase 3 trial
2016年12月度化学療法プロトコル審査委員会承認: 2016年12月12日