

血管肉腫(進行・再発) 1st Line

# PTX weekly療法

( )コース目

患者ID: @PATIENTID

患者氏名: @PATIENTNAME

アルコールアレルギー ※  
必ず無しを確認

身長 (cm)	体重 (kg)	体表面積 (m <sup>2</sup> )
\$HEIGHT01_Doc	\$WEIGHT01_Doc	#VALUE!

投与スケジュール: 1コース 49日 (連続6週間投与、2週間休薬)

使用基準: 開始時; class B、2回目以降; class C

## 《使用薬剤》

パクリタキセル (PTX) : パクリタキセル (1V: 30mg/5mL, 100mg/16.7mL)

## 投与量:

薬剤	標準投与量	計算値 (mg)	投与量 (mg)	投与日
パクリタキセル	100 mg/m <sup>2</sup>	#VALUE!		1, 8, 15, 22, 29, 36

## << タイムスケジュール: 開始時刻 >>

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

2月1日

(金)

0時00分

内服

レスタミンコーワ (10mg) 5T 点滴直前に内服

① 生理食塩液 50mL + ガスター 1A + デキサート 6.6mg 1V

※デキサート初回は6.6mg、2回目以降は3.3mg (1.65mg × 2A) 可、半量ずつ1.65mg × 0.5Aまで減量可

15分で点滴静注

0時15分

② 生理食塩液 100mL

30分で点滴静注

0時45分

③ 生理食塩液 250mL + パクリタキセル mg

0.22μ以下のフィルター一体型輸液セットを使用する

60分で点滴静注

0.0ml

1時45分

④ 生理食塩液 50mL (フラッシュ)

2月8日

2月15日

2月22日

3月1日

3月8日 も同様に行う

※ ①と③の間は少なくとも30分間隔をあけて投与

## REFERENCE

Nicolas Penel, Binh Nguyen Bui, Jacques-Olivier Bay, Didier Cupissol, Isabelle Ray-Coquard et al

Phase II Trial of weekly Paclitaxel for Unresectable Angiosarcoma : The ANGIOTAX Study

J Clin Oncol 26 Vol 26 : 5269-5274, 2008

2012年6月度化学療法プロトコル委員会承認 : 2012年6月11日