

骨巨細胞腫

Denosumab療法 (RANMARK)

()コース目

患者ID :

患者氏名 :

身長 (cm)	体重 (kg)	体表面積 (m ²)
		#VALUE!

投与スケジュール: 120mgを第1日, 第8日, 第15日, 第29日, その後は4週間に1回, 皮下投与する。

《使用薬剤》

デノスマブ: ランマーク (120mg/1.7mL/V)

- ※ 投与開始前に、可能な限り口腔内、抜歯予定等がないか確認すること。
- ※ 定期的に血清カルシウム等の電解質濃度を測定すること。
- ※ ルアーロックシリンジ、27Gの注射針の使用が推奨。
- ※ 投与前に室温に戻した後、使用すること。
- ※ grade3~4の副作用が発現した場合、grade1以下に回復するまで休薬を考慮すること。
- ※ 細胞障害性の少ない薬剤のため、皮下注施行者は限定しない。

投与量:

薬剤	標準投与量	投与量 (mg)	投与日
ランマーク	120 mg/body	120	1. 8. 15. 29 (以降4週に1回)

<< タイムスケジュール: 開始時刻 >>

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

7月12日 (月) 0時00分 ① ランマーク 120mg

上腕、大腿、腹部に皮下注射

※皮下注射のみに使用。

注射針が血管内に刺入していないか確認すること。

REFERENCE

David Thomas, Robert Henshaw, Keith Skubitz, Sant Chawla, et al: Lancet Oncol 2010;11:275-80
Denosumab in patients with giant-cell tumour of bone: an open-label, phase 2 study

2018年4月度化学療法プロトコール審査委員会承認: 2018年4月9日