

# 軟部肉腫（進行・再発） 1st Line ドキソルビシン（ADR）単独療法

患者ID： @PATIENTID

コース目

患者氏名： @PATIENTNAME

身長(cm)	体重(kg)	体表面積(m <sup>2</sup> )
HEIGHT01_Dc	HEIGHT01_Dc	#VALUE!

投与スケジュール： 1コース 21日間

使用基準： class A（次回以降 class B）

注意事項： 原則、ドキソルビシン **総投与量は500mg/m<sup>2</sup>以内**とする。

投与前～投与中の心機能異常に要注意。

## 《使用薬剤》

ドキソルビシン（ADR）：ドキソルビシン塩酸塩注射用 10mg/V、50mg/V

投与量：

薬剤	投与量	計算値	投与量(mg)	投与日
ドキソルビシン	75 mg/m <sup>2</sup>	#VALUE!		1

<< タイムスケジュール：開始時刻 >>

**※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。**

開始日： 1月1日（金）

0時00分 ① 生理食塩液 50mL + グラニセトロン 1A + デキサート 13.2mg

15分で点滴静注

0時15分 ② 生理食塩液 50mL + ドキソルビシン 0mg

全開 10分以内で点滴静注

**※血管痛、静脈炎に注意!**

0時25分 ③ 生理食塩液 250mL（ドキソルビシン終了後直ちに）

全開 20分以内で点滴静注（フラッシュ）

Day2～ 1月2日（土）～

内服 デカドロン(0.5mg) 16錠 2×(2) 朝・昼食後

## REFERENCE

OS Neilsen, P Dombernowsky, H Mouridsen, et al : British Journal of Cancer (1998) 78(12), 1634-1639

High-dose epirubicin is not an alternative to standard-dose doxorubicin in the treatment of advanced soft tissue sarcomas. A study of the EORTC soft tissue and bone sarcoma group.

2010年12月度化学療法プロトコル審査委員会承認：2010年12月13日