

頭頸部癌 扁平上皮癌 (進行・再発) 1st Line  
**CDDP+RT療法**

患者ID: @PATIENTID

1

コース目

患者氏名: @PATIENTNAME

身長 (cm)	体重 (kg)	体表面積 (m <sup>2</sup> )
HEIGHT01_Dc	WEIGHT01_Dc	#VALUE!

投与スケジュール: 1クール: 21日間 目標コース回数: 3コース

使用基準: class A

指示1: 尿量測定 毎日  
 指示2: 体重測定 毎日起床時  
 指示3: 利尿剤投与指示 以下条件でフロセミド1A iv

Day1 開始から21時(約10時間)の尿量 ≤ 800mL  
 Day2 治療開始より24時間までの尿量 ≤ 2000mL  
 Day3~終了翌日 治療継続中における24時間の尿量 ≤ 1500mL

化学療法開始直前と比べて 2kg以上の体重増加があり、利尿剤未使用

注意: Day5以降も水分摂取が少ない場合や尿量が少ない場合には、輸液を考慮すること

《使用薬剤》

シスプラチン (CDDP): シスプラチン注 50mg/100mL/V、10mg/20mL/V

投与量:

薬剤	標準投与量	計算値	投与量 (mg)	投与日
シスプラチン	100 mg/m <sup>2</sup>	#VALUE!		1

<< タイムスケジュール: 開始時刻 >>

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

開始日: 1月1日 (火)

day1 0時00分 ① 生理食塩液 500mL × 2  
 4時間(2時間×2)で点滴静注

3時15分 **内服** アプレピタントカプセル 125mg 1×(1) シスプラチン開始1時間前頃

4時00分 ② 生理食塩液 50mL + アロキシ 1V + デキサート 9.9mg  
 15分で点滴静注

4時15分 ③ 生理食塩液 700mL + シスプラチン 0mg 0.0mL  
 2時間で点滴静注

6時15分 ④ マンニトール 300mL  
 30分で点滴静注

6時45分 ⑤ 生理食塩液 50mL + フロセミド 1A  
 15分で点滴静注

7時00分 ⑥ 生理食塩液 500mL × 2  
 4時間(2時間×2)で点滴静注

11時00分 ⑦ ソリタT3号 500mL  
 2時間で点滴静注

Day2~3; 1月2日 (水) ~ 1月3日 (木)

起床後 **内服** アプレピタントカプセル 80mg 1×(2) 起床後

0時00分 ① 生理食塩液 50mL + デキサート 6.6mg  
 15分で点滴静注

0時15分 ② 生理食塩液 500mL × 2  
 4時間(2時間×2)で点滴静注

4時15分 ③ ソリタT3号 500mL  
 2時間で点滴静注

Day4~5; 1月4日 (金) ~ 1月5日 (土)

0時00分 ① フィジオ140 500mL × 2  
 4時間(2時間×2)で点滴静注

4時00分 ② ソリタT3号 500mL  
 2時間で点滴静注

REFERENCE

By David J. Adelstein, Yi Li, George L. Adams, et al: J Clin Oncol 21: 92-98  
 An Intergroup Phase III Comparison of Standard Radiation Therapy and Two Schedules of Concurrent Chemoradiotherapy  
 in Patients With Unresectable Squamous Cell Head and Neck Cancer  
 2014年5月度化学療法プロトコール審査委員会承認: 2014年5月12日 更新: 2016年7月14日