

頭頸部癌（進行・再発）  
DTX単独療法

2nd Line以降

( )コース目

患者ID： @PATIENTID

患者氏名： @PATIENTNAME

身長 (cm)	体重 (kg)	体表面積 (m <sup>2</sup> )
\$HEIGHT01_Doc	\$WEIGHT01_Doc	#VALUE!

投与スケジュール： 1コース 21～28日

使用基準： class A

《使用薬剤》

ドセタキセル (DTX)：ドセタキセル点滴静注 (1V：20mg、80mg)

投与量：

薬剤	標準投与量	計算値 (mg)	投与量 (mg)	投与日
ドセタキセル	60 mg/m <sup>2</sup>	#VALUE!		1

<< タイムスケジュール：開始時刻 >>

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

day1 1月1日 (金)

0時00分 ① 生理食塩液 50mL + グラニセトロン 1A + デキサート 13.2mg  
15分かけて点滴投与

0時15分 ② 生理食塩液 250mL + ドセタキセル mg  
要注意 1時間かけて点滴投与

点滴開始から10分間は点滴速度を遅めに設定して、全身状態を観察する。

1時15分 ③ 生理食塩液 50mL (フラッシュ)  
フラッシュ

REFERENCE

犬山 征夫, 形浦 昭克, 戸川 清 他: 癌と化学療法 第26巻 第1号 1999年1月  
進行・再発頭頸部癌に対するRP56976(Docetaxel)の後期第II相臨床試験: 他施設共同研究  
2010年9月度化学療法プロトコル審査委員会承認: 2010年9月13日、更新: 2016年11月17日