

頭頸部癌(進行・再発) 2nd Line

PTX weekly療法

()コース目

患者ID : @PATIENTID

患者氏名 : @PATIENTNAME

アルコールアレルギー ※必ず無しを確認

身長 (cm)	体重 (kg)	体表面積 (m ²)
\$HEIGHT01_Doc	\$WEIGHT01_Doc	#VALUE!

投与スケジュール: 1コース 49日 7日毎6回投与2週間休薬

使用基準: 開始時; class B、2回目以降; class C

《使用薬剤》

パクリタキセル (PTX) : パクリタキセル (1V : 30mg/5mL, 100mg/16.7mL)

投与量:

薬剤	標準投与量	計算値 (mg)	投与量 (mg)	投与日
パクリタキセル	100 mg/m ²	#VALUE!		1, 8, 15, 22, 29, 36

<< タイムスケジュール: 開始時刻 >>

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

1月1日 (金) 0時00分	内服	レスタミンコーワ (10mg) 5 T	点滴直前に内服
	①	生理食塩液 50mL + ガスター 1A + デキサート 6.6mg 1V	15分かけて点滴静注
0時15分	②	生理食塩液 100mL	30分かけて点滴静注
0時45分	③	生理食塩液 250mL + パクリタキセル注	mg
		0.22μ以下のフィルター一体型輸液セットを使用する	
		1時間かけて点滴静注	0.0ml
1時45分	④	生理食塩液 50mL (フラッシュ)	

1月8日 と 1月15日 と 1月22日 も同様に行う 2月12日 は休薬
1月29日 と 2月5日

※ ①と③の間は少なくとも30分間隔をあけて投与

2012年1月度化学療法プロトコール委員会承認: 2012年1月16日