

# 胚細胞腫 進行・再発 3rd Line TIP療法

コース目

患者ID : @PATIENTID

患者氏名 : @PATIENTNAME

身長 (cm)	体重 (kg)	体表面積 (m <sup>2</sup> )
HEIGHT01_D	HEIGHT01_D	#VALUE!

投与スケジュール: 1コース 21日間 目標: 4コース

指示1: 尿量測定 毎日

指示2: 体重測定 毎日起床時

指示3: 利尿剤投与指示 以下条件でフロセミド1A iv

Day2 開始から21時(約10時間)の尿量 ≤ 800mL

Day3 治療開始より24時間までの尿量 ≤ 2000mL

Day4~終了翌日 治療継続中における24時間の尿量 ≤ 1500mL

化学療法開始直前と比べて2kg以上の体重増加があり、利尿剤未使用

注意: Day7以降も水分摂取が少ない場合や尿量が少ない場合には、輸液を考慮すること

## 《使用薬剤》

パクリタキセル (PTX) : (パクリタキセル) 30mg/5mL/V、100mg/16.7mL/V

シスプラチン (CDDP) : シスプラチン注 50mg/100mL/V、10mg/20mL/V

イホスファミド (IFM) : (イホファミド) 1000mg/V

## 投与量:

薬剤	投与量	計算値	投与量 (mg)	投与日
パクリタキセル	210 mg/m <sup>2</sup>	#VALUE!		1
シスプラチン	20 mg/m <sup>2</sup>	#VALUE!		2~6
イホファミド (IFM)	1200 mg/m <sup>2</sup>	#VALUE!		2~6

## << タイムスケジュール: 開始時刻 >>

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

Day1: 1月1日 (火)

- 1時15分 ① レスタミンコーワ (10mg) 5 T 点滴直前に内服  
生理食塩液 50mL + ガスター 1A + デキサート 16.5mg 1V  
15分かけて点滴静注
- 1時30分 ② 生理食塩液 100mL + グラニセトロン 1A  
30分かけて点滴静注
- 2時00分 ③ 生理食塩液 500mL + パクリタキセル mg  
0.22μ以下のフィルタ一体型輸液セットを使用する
- 5時00分 ④ 生理食塩液 50mL (フラッシュ) 0.0mL

Day2: 1月2日 (水)

- 0時00分 ① 生理食塩液 500mL  
2時間で点滴静注
- 1時00分 ② 内服 アプレピタントカプセル 125mg 1×(1) シスプラチン開始1時間前頃
- 1時45分 ③ 生理食塩液 50mL + アロキシ 1V + デキサート 9.9mg  
15分で点滴静注
- 2時00分 ④ 生理食塩液 500mL + シスプラチン 0mg  
2時間で点滴静注 0.0mL
- 4時00分 ⑤ 生理食塩液 250mL + イホファミド (IFM) 0mg  
2時間で点滴静注
- 4時00分 ⑥ 生理食塩液 50mL + ウロミテキサン 4A (イホファミド投与時)  
15分で点滴静注
- 6時00分 ⑦ ソリタ T3号 500mL  
2時間で点滴静注
- 8時00分 ⑧ ソリタ T3号 500mL  
2時間で点滴静注
- 8時00分 ⑨ 生理食塩液 50mL + ウロミテキサン 4A (イホファミド4時間後)  
15分で点滴静注
- 10時00分 ⑩ ソリタ T3号 500mL  
2時間で点滴静注
- 12時00分 ⑪ 生理食塩液 50mL + ウロミテキサン 4A (イホファミド8時間後)  
15分で点滴静注

Day3~6 ; 1月3日 (木) ~ 1月6日 (日)

起床後 **内服** アプレピタントカプセル 80mg 1×(2) 起床後

- メイン 側管**
- 0時00分 ① 生理食塩液 500mL  
2時間で点滴静注
- 1時45分 ② 生理食塩液 50mL + デキサート6.6mg  
15分で点滴静注
- 2時00分 ③ 生理食塩液 500mL + シスプラチン **0mg**  
2時間で点滴静注 0.0mL
- 4時00分 ④ 生理食塩液 250mL + イスファミド (IFM) **0mg**  
2時間で点滴静注
- 4時00分 **④'** 生理食塩液 50mL + ウロミテキサン4A (イスファミド投与時)  
15分で点滴静注
- 6時00分 ⑤ ソリタT3号 500mL  
2時間で点滴静注
- 8時00分 ⑥ ソリタT3号 500mL  
2時間で点滴静注
- 8時00分 **⑥'** 生理食塩液 50mL + ウロミテキサン4A (イスファミド4時間後)  
15分で点滴静注
- 10時00分 ⑦ ソリタT3号 500mL  
2時間で点滴静注
- 12時00分 ⑧ 生理食塩液 50mL + ウロミテキサン4A (イスファミド8時間後)  
15分で点滴静注

---

#### REFERENCE

G. Varuni Kondagunta, Jennifer Bacik, Alessoa Donadio, et al; J Clin Oncol Vol23, No27, 2005: pp6549-6555  
Combination of Paclitaxel, Ifosfamide, and Cisplatin is an effective second-line therapy for patients with relapsed testicular germ cell tumor

Koji Kawai, Jun Miyazaki, Sadamu Tsukamoto, et al; Jpn J Clin Oncol, 2003 33(3): pp127-131  
Paclitaxel, Ifosfamide and Cisplatin regimen is feasible for Japanese patients with advanced germ cell cancer  
2013年10月度化学療法プロトコール審査委員会承認 更新: 2016年7月14日